



ASTIGMATISMO INDUCIDO POR QUERATITIS PUNTEADA SUPERFICIAL TRAS CIRUGÍA LASIK A PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Fernández del Cotero, Belén Torres, Andrés Picó
Centre d'Oftalmologia Barraquer

Presentamos el caso de una mujer de 22 años, con un astigmatismo hipermetrópico con DV= 0.3 180°-2 +5 =1.1 y IV=0.35 170°-1.75 +4.25 confirmado con topografía ORBSCAN cuyo único antecedente de interés son unos leucomas periféricos sobre las 12h en OD y sobre las 6h en OI que no le quitan visión. Se opera de cirugía refractiva LASIK en ambos ojos, con resultados de visión de DV= 1.05 IV= 1.2 que no mejora con corrección a los dos meses de la cirugía. A los 5 meses acude por una disminución de la visión IV = 0.15 170°-2.5= 0.85, en la exploración biomicroscópica se observa una QPS en la mitad inferior de la córnea del OI se realiza una topografía ORBSCAN donde se objetiva el astigmatismo corneal. Tras el tratamiento lubricante y antiinflamatorio a los 15 días la visión pasa IV= 0.8 150-0.50= 1. Este tipo de complicación tardía de la cirugía LASIK ocurre en menos del 1,1% variando según las series, el tratamiento del defecto epitelial produce una recuperación de la visión en la mayoría de los casos.

