



## 2 NOUS CASOS DE FROSTED BRANCH ANGIITIS

Maria Mas Castells, Rubén Delgado Weingarstopher, Nacho Vela Sagarra,  
Jesús Díaz Cascajosa  
*Hospital de la Santa Creu i Sant Pau*

Presentem el cas de 2 pacients diagnosticats de 'frosted branch angiitis' al nostre centre durant l'any 2016. Es tracta de dos nens, un de 7 i un de 8 anys, sense antecedents patològics ni oftalmològics d'interès. Consulten per miodesòpsies, fotofòbia i dolor ocular bilateral. L'agudeses visual està conservada. L'exploració del segment anterior evidencia una important injecció conjuntival i una abundant reacció inflamatòria en càmera anterior, sense fibrina ni sinèquies. La fundoscòpia revela vasculitis en forma de 'frosted branch angiitis'. El primer pacient tenia l'antecedent d'episodi de bronquitis feia 3 setmanes i el segon un episodi pseudogripal també de 3 setmanes d'evolució. Ambdós van iniciar tractament amb corticosteroid sistèmic, tòpic, midriàtic i tractament empíric amb Valaciclovir oral, a la espera de les serologies per citomegalovirus (CMV), que van acabar resultant negatives. Des de la descripció del primer cas de frosted branch angiitis en un nen de 6 anys japonès el 1976 per Ito, s'han descrit menys de 100 casos a nivell mundial d'aquest síndrome. Dins de la classificació etiològica de Kleiner, aquests dos casos s'inclourien dins del grup de patologies de causa infecciosa o inflamatòria o autoimmunitària.

