



ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CASOS DE UVEÍTIS ANTERIORES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO. ETIOLOGÍAS MÁS FRECUENTES, TIEMPOS DE REMISIÓN Y RECIDIVA

Alba Serrano Peluffo, Meilin Chang Sotomayor, Anna Camós Carreras, Alejandra Nieto Jordán, Javier Zarranz-Ventura, Alfredo Adán
Hospital Clínic

Objetivo: Describir las etiologías más frecuentemente encontradas en los casos de uveítis anteriores diagnosticadas en el servicio de urgencias de nuestro hospital, además de los tiempos de remisión y recidiva de éstos. **Método:** Estudio retrospectivo de las uveítis anteriores atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona desde Enero de 2013 hasta Junio de 2015. Se excluyeron las queratouveítis herpéticas, uveítis postraumáticas, postquirúrgicas, intermedias, posteriores y panuveítis. El análisis estadístico fue realizado con IBM SPSS Statistics V22.0. **Resultados:** Se analizaron un total de 362 uveítis anteriores de 326 pacientes (36 casos bilaterales). En 144 casos se identificó la etiología de base, siendo las más frecuentes la Espondiloartropatía HLAB-27 positivo (28%), Espondilitis anquilosante (25%) y Herpéticas (13%). En 234 casos (65%) se pudo identificar la fecha de remisión siendo el tiempo promedio de remisión de 25 días (basado en los criterios del SUN). En 107 casos se pudo documentar una recidiva, siendo el tiempo promedio entre remisión y recidiva de 393 días. En cuanto a la probabilidad de recidiva, se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p=0.035$) entre los casos naive vs los casos con historia de ≥ 1 episodio, siendo mayor en el primer grupo. **Conclusiones:** Los brotes de uveítis anteriores son un diagnóstico frecuente en los servicios de urgencias; es necesario el seguimiento y estudio de estos casos para identificar en lo posible la etiología subyacente e instaurar un tratamiento específico, que en muchos casos requiere un manejo multidisciplinar.

