



TRES MODALITATS DE COROÏDITIS SERPIGINOSA (CS): CLÀSSICA, INFECCIOSA I MACULAR

Victòria Viñals Bosch, Kazem Mousavi

Hospital Universitari MútuaTerrassa, Centre Ocular Quirúrgic de Terrassa

Objectiu. Presentar les característiques diferencials de la Coroïditis Serpiginosa (CS) clàssica, la CS macular i la coroïditis serpiginosa infecciosa multifocal que simula la CS, a propòsit de tres casos. La distinció és imprescindible pel correcte tractament de la patologia. Mètode. Primer cas: Home de 53 anys afectat de CS clàssica resistent al tractament convencional. Segon cas: Dona de 37 anys que consulta per disminució de l'agudesesa visual (AV) unilateral, la fundoscòpia i el resultat de les serologies és compatible amb coroïditis tuberculosa serpiginosa. Tercer cas: Nen de 10 anys afectat de CS macular. Cribatge de malalties autoimmunitàries, serologies, quantiferon i PCR vítria per *Toxoplasma gondii* i Herpes virus negatius. Resultats. Primer cas: L'únic tractament que va resultar efectiu en induir la remissió de la malaltia va ser l'infliximab. Segon cas: La pacient va rebre tractament amb teràpia antituberculosa de 4 fàrmacs, prednisolona via oral i àcid fòlic. Després de dos mesos, l'AV va millorar i les lesions del fons d'ull van estabilitzar-se. Tercer cas: Actualment en tractament amb prednisolona via oral, metotrexat i àcid fòlic, sense progressió de la malaltia. Conclusions. La coroïditis serpiginosa és una inflamació recurrent, asimètrica, bilateral i progressiva de la coroides interna que implica la coriocapil·lar i l'epiteli pigmentari de la retina. L'evidència actual suggereix que la CS és fonamentalment un procés idiopàtic o autoimmunitàric. S'ha descrit un subgrup considerable de pacients amb característiques atípiques que mimetitzen la CS, s'han classificat com CS infecciosa i es tracta d'una coroïditis infecciosa secundària a *Mycobacterium Tuberculosis*.

