



**50<sup>0</sup>** CONGRESO  
SOCIETAT CATALANA  
D'OFTALMOLOGIA

ACTUALIZACIÓN  
EN OFTALMOLOGÍA

28, 29 y 30 de Noviembre de 2019  
Auditori AXA/Barcelona



Societat  
Catalana  
d'Oftalmologia



## SECUELAS DE SEGMENTO ANTERIOR POR GLAUCOMA AGUDO, A PROPÓSITO DE UN CASO

Cintia Viktória Rétháto, Joel Suarez, Lorena Flores, Maria Pilar Navarro, Sofía del Pozo  
*Hospital General de Granollers*

El glaucoma agudo por cierre angular primario es una entidad causada por la oclusión de la malla trabecular por el iris periférico que obstruye el drenaje del humor acuoso provocando un aumento brusco de la presión intraocular (PIO). Esta elevación de la PIO puede causar secuelas oculares irreversibles, igual que en el caso clínico que se presenta.

Se trata de una mujer caucásica de 50 años que tras sufrir un ataque de glaucoma agudo de ángulo cerrado presentó anisocoria, atrofia e hiporreactividad de iris y glaukomflecken en el ojo afectado.

Estas alteraciones de segmento anterior que pueden dificultar la extracción de la catarata, acto necesario para un mejor control de la presión intraocular.