



50⁰ CONGRESO
SOCIETAT CATALANA
D'OFTALMOLOGIA

ACTUALIZACIÓN
EN OFTALMOLOGÍA

28, 29 y 30 de Noviembre de 2019
Auditori AXA/Barcelona



Societat
Catalana
d'Oftalmologia



ANÀLISI D'UNA SÈRIE DE CASOS CONSECUTIUS DE PACIENTS OPERATS DE CATARACTA TRAUMÀTICA PER TERÀPIA INTRAVÍTRIA O VITRECTOMIA PRÈVIA

Xavier Carreras Castañer; Meiling Chang Sotomayor; Xavier Corretger Ruhí
Institut Clínic d'Oftalmologia, Hospital Clínic de Barcelona

INTRODUCCIÓ

La cirurgia de cataracta traumàtica suposa un repte en la pràctica clínica que ha augmentat la seva incidència amb l'increment dels requeriments de teràpia intravítrea (TIV) que ens trobem en l'actualitat.

METODOLOGIA

Es presenta una sèrie de 5 casos intervinguts entre 2018-2019 després d'haver rebut TIV (3) o vitrectomia via pars plana (VPP) (2). D'aquests se'n recullen l'agudesa visual (AV) prèvia i posterior a la cirurgia així com el procediment quirúrgic, les complicacions durant i posteriors a la cirurgia.

RESULTATS

L'edat mitja de la nostra cohort és de 59,2 anys i inclou 2 homes i 3 dones de raça caucàsica.

Dos dels tres casos post-TIV es van donar per teràpia amb Ozurdex, mentre que el restant va rebre un anti-VEGF. Els dos casos restants s'havien intervingut de vitrectomia per hemovítria i despreniment de retina.

L'AV preoperatòria mitja fou de 0,038 i la postoperatòria de 0,29 mesurades en escala decimal i mostrant una milloria de 0,252.

Pel que fa a complicacions, 3 d'ells van requerir VPP per caiguda de contingut a càmera vítria i un quart va necessitar vitrectomia anterior per a eliminar restes vítries de càmera anterior.

A nivell de lents, a 3 pacients es van implantar lents de 3 peces a sulcus amb captura òptica, un precisà una Verisyse prepupilar i el darrer una lent monobloc intracapsular.

CONCLUSIÓ

Amb aquesta sèrie es mostra el potencial guany visual post-quirúrgic en aquest subgrup de pacients, que dependrà de la patologia retiniana prèvia així com de l'alta incidència de complicacions intraoperatòries.