



**50<sup>0</sup>** CONGRESO  
SOCIETAT CATALANA  
D'OFTALMOLOGIA

ACTUALIZACIÓN  
EN OFTALMOLOGÍA

28, 29 y 30 de Noviembre de 2019  
Auditori AXA/Barcelona



Societat  
Catalana  
d'Oftalmologia



## DEGENERACIÓ MARGINAL PEL·LÚCIDA: A PROPÒSIT D'UN CAS

Xavier Carreras Castañer; Josep Torras Sanvicens  
*Institut Clínic d'Oftalmologia, Hospital Clínic de Barcelona*

### INTRODUCCIÓ

La degeneració marginal pel·lúcida consisteix en un subtipus d'ectàsia corneal on s'observa un aprimament corneal perifèric inferior, separat del limbe esclero-corneal per 1-2mm de còrnia sana. No obstant això, el seu diagnòstic pot donar lloc a confusió amb els queratocons desplaçats inferiorment.

És pel comentat anteriorment que caldrà una correcta exploració i una topografia que ens mostri la curvatura anterior i posterior pel correcte diagnòstic diferencial.

### CAS

A continuació es presenta el cas d'un baró de 17 anys i raça caucàsica que ens és remès per a ampliar l'estudi amb l'orientació diagnòstica de queratocon bilateral.

A l'exploració presentava una agudeses visual corregida de 0'75 en escala decimal a ambdós ulls i per biomicroscòpia s'observava un aprimament inferior acompanyat de certa fibrosi.

El cas es va orientar com a una degeneració marginal pel·lúcida i es va oferir al pacient la possibilitat de rebre tractament amb anells corneals i riboflavina donada l'edat i la progressió que presentava.

### CONCLUSIÓ

La correcta orientació dels casos de degeneració marginal pel·lúcida és important no solament de cara a oferir possibles alternatives terapèutiques sinó també per a marcar un possible pronòstic. Serà de vital importància una exploració biomicroscòpica completa així com una topografia de curvatura anterior i posterior.