



50⁰ CONGRESO
SOCIETAT CATALANA
D'OFTALMOLOGIA

ACTUALIZACIÓN
EN OFTALMOLOGÍA

28, 29 y 30 de Noviembre de 2019
Auditori AXA/Barcelona



Societat
Catalana
d'Oftalmologia



FÍSTULA LAGRIMAL CONGÉNITA: CLÍNICA Y TERAPÉUTICA

Anna March De Ribot; Francesc March De Ribot; ariel Ceriotto; Guillermo Salcedo Casillas
Hospital Universitario

Objetivo: El objetivo de este video es presentar los signos clínicos y la técnica quirúrgica para el tratamiento de la fístula lagrimal congénita.

Caso clínico: Paciente masculino de 15 años de edad consulta por epífora izquierda a través de un punto lagrimal adicional. Se observa un punto lagrimal supernumerario congénito izquierdo y un canalículo inferior al tendón cantal medial que se comunica con el sistema lagrimal. En la prueba de fluoresceína, el riego drena a través del sistema lagrimal hacia la piel. Bajo anestesia general, se realiza una intubación lagrimal y fistulectomía completa. El paciente permanece asintomático en el seguimiento posoperatorio.

Conclusiones: La fístula lagrimal congénita es una anomalía rara del sistema lagrimal. Los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar epífora y dacriocistitis. Cuando precisa tratamiento, el manejo quirúrgico representa una solución definitiva pero controvertida. La dacriocistorrinostomía asociada con fistulectomía se considera comúnmente en pacientes mayores de 2.5 años de edad; aunque la intubación lagrimal se puede realizar con buenos resultados cuando no se asocia una obstrucción del conducto lacrimonasal.

