

52^è

Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia

25, 26 i 27 DE NOVEMBRE DE 2021 - AUDITORI AXA / BARCELONA



w w w . s c o f t . c a t

TRATAMIENTO DE LA DIPLOPÍA EN EL PACIENTE ADULTO

Dora Fernández-Agrafojo; Yasser Guerrero; Hari Morales; Paula Gil
Centro INOF. Centro Médico Teknon

El objetivo es mostrar nuestra experiencia tras explorar y tratar pacientes estrábicos adultos que presentan diplopía.

Se hizo búsqueda retrospectiva de pacientes > 21 años de edad que acudieron a consulta por estrabismo y diplopía, constante o intermitente. Se revisaron los datos encontrados antes y entre los 4 y 12 meses después del tratamiento. Se realizó en un cierto número de casos cirugía refractiva con el fin de recuperar la visión binocular, después de un estudio sensorial largo y profundo.

Las opciones fueron cirugía de estrabismo, cirugía refractiva (Lasik, lente intraocular (IOL), lente ICL o cirugía de cataratas), corrección prismática y ortóptica. Se tuvo en cuenta la frecuencia de la diplopía y la calidad de la visión con el test de puntaje VF14 antes y después del tratamiento.

Se revisaron 30 casos. Los resultados encontrados mostraron una reducción en el grado de estrabismo y mejoría en la puntuación con el test Vf14. La frecuencia de la diplopía después del tratamiento también se redujo o desapareció.

Se considera que la cirugía del estrabismo nos permite eliminar o reducir los síntomas de diplopía en estos pacientes. La cirugía refractiva puede acabar siendo una excelente opción ya que recuperamos la visión binocular en según que casos. También puede ser un buen plan terapéutico complementario o previo a la cirugía.