

QUERATOCONJUNTIVITIS ASSOCIADA A L'ÚS DE DUPILUMAB EN POBLACIÓ PEDIÀTRICA: SÈRIE DE CASOS

Laura Pulido Sánchez-Carnerero, Anna Monés Llivina, Maria Calatayud Riera, Nevena Romanic
Bubalo

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

El Dupilumab és el primer fàrmac biològic aprovat per la FDA per al tractament de la dermatitis atòpica (DA), però també està indicat per l'asma persistent i la rinosinusitis crònica, entre d'altres patologies relacionades amb l'atopia. Cada cop s'utilitza més per la seva eficàcia i el seu bon perfil de seguretat davant la dermatitis atòpica greu, inclús en la població pediàtrica.

S'han notificat reaccions adverses oftalmològiques freqüents i lleus com la conjuntivitis (de qualsevol tipus) i la queratitis, però també d'altres de més greus i infreqüents com són la queratitis ulcerativa, la blefaroconjuntivitis cicatritzant, la malaltia penfigoide-like o una panuveïtis bilateral.

Es presenten 4 pacients pediàtrics entre 4 i 15 anys en tractament amb Dupilumab, 3 d'ells per dermatitis atòpica moderada-severa i un per asma persistent. Tots els pacients han presentat queratoconjuntivitis al·lèrgica en grau variable, que es controla total o parcialment amb antihistamínics i corticoides tòpics.

Creiem que és obligatori realitzar visites de seguiment a tots els nens que inicien tractament amb Dupilumab per tots els efectes adversos descrits anteriorment.