

## FASCITIS NECROTIZANTE PERIOCLAR: REVISIÓ SISTEMÀTICA Y PRESENTACIÓ DE CUATRO CASOS

David Oliver-Gutiérrez; Elena Ros Sánchez; Tatiana Goncharova; Gloria Segura Duch; Tirso Alonso;  
Joan Oliveres

*Hospital Vall d'Hebron*

**Propósito:** Resumir cuatro casos propios de Fascitis Necrotizante perioclar y realizar una revisión sistemática de la literatura.

**Método:** Se describen los casos propios y se realiza una búsqueda sistemática en Pubmed, WOS, Scopus y Emabase utilizando los términos: Necrotizing Fasciitis AND (Ophthalmology OR Periorbital OR Perioclar OR Eyelid). La búsqueda se limitó a artículos publicados en los últimos 10 años en inglés o español.

**Resultados:** Tras eliminar duplicados se identificaron 173 artículos. De estos, 100 fueron excluidos. En total se obtuvo información de 174 pacientes. La edad media de presentación de las FN es 52.3 años (SD=17.6), con ligera predominancia en hombres (54%). Se observó afectación bilateral en el 33% de los casos y, en un 55%, la afectación se extendía más allá de la órbita. El agente etiológico más común fue el Streptococcus Pyogenes (82%). La mayoría fueron desbridados (87%) en al menos una ocasión; 15 casos (9%) resultaron en enucleación/exenteración. Un 22% experimentó shock séptico y la mortalidad fue del 5%.

**Conclusión:** La NF perioclar es una patología infrecuente. Debe mantenerse un alto índice de sospecha en pacientes que muestren edema e induración más allá del área eritematosa, crepitación o presencia de aire en estudios de imagen, o ampollas necróticas. La detección temprana y el tratamiento con desbridamiento agresivo, junto con la administración de antibióticos intravenosos adecuados, son cruciales para el pronóstico. No obstante, incluso con el tratamiento óptimo, las secuelas estéticas son habituales y pueden surgir complicaciones graves, como pérdida de visión o incluso la muerte.