54è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
23, 24 I 25 DE NOVEMBRE DE 2023
AUDITORI AXA/BARCELONA

REDESCUBRIENDO LA HIPOPLASIA FOVEAL: LA OCT COMO TÉCNICA DIAGNÓSTICA FUNDAMENTAL, A PROPÓSITO DE 4 CASOS CLÍNICOS.

Patricia Pera; Ignasi Jürgens; Melisa Piccoo

Institut Català de Retina

La hipoplasia foveal es una condición macular caracterizada por un desarrollo incompleto de la morfología de la fóvea que puede llevar a diversos grados de déficit visual. La OCT, una técnica de imagen rápida, no invasiva y de alta resolución. se ha mostrado como una herramienta imprescindible para la detección y caracterización de esta patología, revelando detalles que otros métodos de imagen no han conseguido captar. La hipoplasia de fóvea es una alteración con alta heterogeneidad de causas y la OCT ha facilitado la identificación de nuevas asociaciones entre la hipoplasia y otras patologías retinianas en la que la presencia de hipoplasia macular con otras técnicas de imagen pasaba desapercibida.
Presentamos 4 casos clínicos en los cuales la OCT y la Angio-OCT jugaron un papel decisivo en la detección de hipoplasia foveal. Estos ejemplos resaltan la eficacia de esta tecnología en el diagnóstico de esta condición, particularmente en casos de hipoplasia macular aislada.