

## LINFOMA VITREO-RETINIANO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sara Garcia Hidalgo; Armand Pairó Salvador; Albert Arnaiz Camacho, Tatiana Pablos Jiménez;  
Natalia Anglada Masferrer; Eric Kirkegaard Biosca; Laura Distefano

*Hospital Universitari Vall d'Hebrón*

### Introducció

El linfoma vítreo-retiniano (LVR) es una variante infrecuente de linfoma primario del Sistema Nervioso Central (SNC) con una incidencia  $<0,05\%$  por 100.000 habitantes/año. Hasta un 90% se asocian con linfoma de SNC concomitante. El LVR secundario es menos frecuente (12-19%) y suele derivar de un linfoma sistémico.

### Caso clínico

Paciente de 78 años con pérdida de agudeza visual en ambos ojos (AO) de 1 mes de evolución. Como antecedentes patológicos destaca derrame pleural con exudado compatible con linfoma B maduro.

En el fondo de ojo se aprecian vitritis y lesiones retinianas amarillentas. Se realizó tomografía de coherencia óptica macular en la que aparece epitelio pigmentario de aspecto granular y zonas hiperreflectivas con pérdida de la arquitectura, y en la retinografía se obtuvieron imágenes con aspecto moteado y puntos hiperreflectivos. Angiografía fluoresceínica con patrón moteado y lesiones perivasculares hiperfluorescentes en tiempos tardíos.

Dada la sospecha de LVR se realiza biopsia vítreo en AO, encontrando un ratio Interleucina (IL)10/IL6 $>1$  sugestivo y citometría de flujo compatible con linfocitos B clonales, comenzándose quimioterapia. Posteriormente aparecen precipitados queráticos y edema de papila. Se realiza RMN cerebral, Punción Lumbar y Biopsia de médula ósea que descartaron metástasis, y el PET-TC reflejó lesiones no biopsiables. Se realizó punción de cámara anterior para inmunofenotipado con resultado compatible con LVR. Debido a progresión se inicia radioterapia mejorando edema, infiltrados y visión.

### Conclusiones

El LVR es una entidad infrecuente en la que es necesaria una evaluación completa para el estadiaje, ya que el curso con frecuencia es agresivo.