

MANIFESTACIONES OFTALMOLOGICAS DE LAS FÍSTULAS CAROTIDO CAVERNOSAS

Maria Massaneda Tuneu , Beatriz Rodriguez Aguado, Yolanda Palomino, Mouafk Asaad

Consorti Sanitari de Terrassa

Introducción: La fistula carótidocavernosa es una entidad poco frecuente que puede presentar múltiples manifestaciones siendo la sintomatología ocular el principal motivo de consulta.

Casos clínicos: El primer caso se trata de un paciente de 83 años con diplopia binocular de 4 meses de evolución. Destacaba una limitación de la abducción del ojo izquierdo junto con ingurgitación de los vasos episclerales a nivel inferior y tortuosidad vascular a la funduscopia. En la angioTAC se apreciaron lesiones compatibles con fístula carótidocavernosa que fue tributaria a embolización. El segundo caso se trata de una paciente de 97 años ya diagnosticada de fístula carótida cavernosa derecha que presentó dolor ocular agudo ipsilateral. La agudeza visual era de PL y destacaba ingurgitación episcleral del ojo derecho, midriasis media arreactiva junto con rubeosis 360°, atalamia temporal y presión intraocular elevada. En la funduscopia se observó hemorragias puntiformes maculares compatibles con síndrome de isquemia ocular. Se orientó como un glaucoma neovascular secundario a síndrome de isquemia ocular por fistula carótido cavernosa. La paciente no era tributaria a embolización y se optó por un manejo conservador con masajes carotídeos y manejo de la presión intraocular. **Conclusion:** La fístula carótido cavernosa es una entidad poco frecuente que si no se detecta puede ser mortal, por ello es necesario una alta sospecha clínica para obtener un diagnóstico y tratamiento precoz.