

ESCLERITIS NODULAR SIMULANT UN MELANOMA COROÏDAL: A PROPÒSIT D'UN CAS

Ilyana Ismael Trias; Daniel Lorenzo Parra; Núria Burguillos Cabrol; Guillermo Font Duch; Josep María Caminal Mitjana

Hospital Universitari de Bellvitge

Els engruiximents focals esclerals després de la cirurgia d'estrabisme són entitats poc comunes tributàries d'un estudi acurat, especialment en casos com el que presentem en aquest treball, en què comporta un repte de diagnòstic diferencial amb el melanoma de coroides. Aquesta es tracta d'una neoplàsia poc comuna, però relativament agressiva, per tant, és important diagnosticar-la correctament.

Exposem el cas d'una dona de 26 anys, amb antecedent de cirurgia d'estrabisme a la infància, referida al nostre centre per estudi i tractament d'una massa coroidal a l'ull esquerre. Presentava una tumoració a nivell de la inserció del recte mig, marronosa-verdosa, suggestiva de melanoma de coroides però amb característiques radiològiques atípiques tan ecogràfiques com a la RMN. Donats els dubtes diagnòstics es decideix realitzar un biòpsia guiada per vitrectomia, la qual mostra un teixit inflamatori-fibrós. Es va fer seguiment de la lesió objectivant una atròfia progressiva de la mateixa fins a arribar a una resolució gairebé completa després d'un any. Donada aquesta evolució es va orientar el cas com a engruiximent focal de l'esclera-coroïdes de caràcter inflamatori, secundària a la cirurgia d'estrabisme i produint una imatge funduscòpica molt semblant a la del melanoma de coroides. La pacient segueix sense recidives fins al moment actual del seguiment.

Es tracta doncs d'una entitat poc descrita, un engruiximent focal escleral després d'una cirurgia d'estrabisme, important a tenir en compte pel diagnòstic diferencial amb el melanoma de coroides.