20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN TUMOR VASOPROLIFERATIVO RETINIANO COMO "RETINOSQUISIS DETACHMENT": A PROPÓSITO DE UN CASO

María S. Pighin, Juan M. López, Ignasi Jürgens

Institut Català de Retina

Los tumores vasoproliferativos retinianos (TVPR) son lesiones benignas infrecuentes, habitualmente de localización inferotemporal y con potencial para producir complicaciones visuales severas. Presentamos el caso de una mujer de 45 años, sin antecedentes sistémicos, derivada para tratamiento quirúrgico de desprendimiento de retina (DR). Presentaba agudeza visual de 20/20 en ambos ojos y refería escotoma superior leve en el ojo izquierdo. La biomicroscopía y la presión intraocular eran normales. En el fondo de ojo se observó un DR asociado a retinosquisis sin desgarros internos, y una masa inferotemporal con vasos aferente y eferente, compatible con un TVPR. Se planteó el diagnóstico diferencial con hemangioblastoma asociado a enfermedad de Von Hippel-Lindau, por lo que se realizó estudio sistémico completo (analítica, ecografía abdominal y resonancia magnética), sin hallazgos relevantes. La paciente fue intervenida mediante vitrectomía pars plana y colocación de cerclaje escleral. La evolución postoperatoria fue favorable, con reabsorción del DR, estabilidad anatómica y conservación de la agudeza visual (20/20). El diagnóstico final fue TVPR primario aislado. Este caso subraya la importancia de considerar lesiones tumorales raras en el diagnóstico diferencial del DR, especialmente ante presentaciones atípicas como la retinosquisis, y refuerza el valor del estudio sistémico para descartar entidades sindrómicas.