20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

HEMORRAGIA RETINIANA SECUNDARIA A TROMBOSIS DE VENA SIMULANDO NEVUS COROIDEO: REPORTE DE UN CASO

Beltrán Gallén, Marc; Nadal Canut, Bernat; Font San Agustín, Miriam; Mateos Olivares, Milagros; Lorenzo Parra, Daniel; Caminal Mitjana, Josep Maria

Hospital de Bellvitge

Introducción:
Los nevus coroideos son lesiones pigmentadas, generalmente asintomáticas y, en la mayoría de casos, hallazgos incidentales. Sin embargo, pueden simular otras patologías. Las hemorragias retinianas secundarias a eventos vasculares pueden presentarse de manera similar, dificultando el diagnóstico diferencial.

Descripción del caso:
Mujer de 72 años, sin antecedentes oftalmológicos de interés, derivada por sospecha de nevus coroideo en ojo derecho tras presentar pérdida súbita de visión. La agudeza visual era de cuenta dedos a 1 metro en ojo derecho y 0,3 en ojo izquierdo. El polo anterior y la presión intraocular fueron normales. La retinografía mostró una lesión subretiniana sobre arcada temporal inferior asociada a depósito fibrinoide subhialoideo superior. La OCT reveló acúmulo de material hiperreflectivo subhialoideo con afectación foveal y material hiperreflectivo subretiniano sobre arcada temporal inferior. En el control a los tres meses se observó reabsorción completa del material fibrinoide y marcada tortuosidad vascular en ojo derecho. Esta evolución orientó el diagnóstico hacia hemorragia retiniana secundaria a trombosis de vena retiniana.

Conclusiones:
La hemorragia retiniana por trombosis venosa puede simular lesiones coroideas como el nevus, generando confusión diagnóstica. El uso de técnicas de imagen multimodal y el seguimiento evolutivo son claves para establecer el diagnóstico correcto y evitar tratamientos innecesarios.