20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

EXPERIENCIA INICIAL CON AFLIBERCEPT 8 MG EN DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD EXUDATIVA REFRACTARIA

Mireia Cucurull Martí; Armand Pairó Salvador; Elena Ros Sánchez; Sara García Hidalgo; Albert Arnaiz Camacho; Tatiana Pablos Jiménez; Miguel Ángel Zapata Victori

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Introducción:
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa supone un reto terapéutico por su curso crónico y la necesidad de tratamientos intravítreos anti-VEGF frecuentes. Eylea® 8 mg (aflibercept en alta dosis) ha mostrado en distintos estudios un perfil de seguridad comparable al de 2 mg, con un mayor porcentaje de pacientes libres de fluido según datos obtenidos mediante tomografía de coherencia óptica (OCT) y posibilidad de espaciar las inyecciones.

Objetivo:
Presentar la experiencia inicial en un hospital terciario con aflibercept 8 mg en pacientes con DMAE exudativa refractarios o insuficientemente controlados con otros anti-VEGF.

Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con DMAE exudativa tratados con Eylea 8 mg en 2025. Todos habían recibido previamente múltiples líneas terapéuticas anti-VEGF. Se recogieron datos de agudeza visual, hallazgos en OCT macular y tolerancia al fármaco.

Resultados:
Se incluyeron 5 pacientes (edad media 88 años). Tras la introducción de Eylea 8 mg se objetivó mejoría anatómica en la mayoría de los casos, con reducción del fluido subretiniano o intrarretiniano y estabilización funcional, incluso en ojos con respuesta parcial a tratamientos anteriores. La tolerancia fue buena, sin complicaciones locales ni sistémicas asociadas a la inyección.

Conclusiones:
En esta serie inicial, Eylea 8 mg mostró un perfil favorable de seguridad y eficacia en pacientes con DMAE exudativa refractaria, apoyando su papel como alternativa prometedora para optimizar el control anatómico y reducir la carga terapéutica en práctica clínica real.