20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

MACULOPATÍA MEDIA AGUDA PARACENTRAL EN PACIENTE INTERVENIDO DE STENT EN TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO

Clara Andorrà Rosiñol, Marina Potau Bermejo, Javier Santos Gutiérrez, Marcos León Alcoceba

Hospital Parc Taulí Sabadell

Introducción:
La maculopatía media aguda paracentral (PAMM) es debida a una disfunción de la perfusión del plexo capilar profundo de la retina y se manifiesta en forma de hiperreflectividad de la capa nuclear interna en la tomografía de coherencia óptica (OCT) que evoluciona a un adelgazamiento de la misma meses después. Se ha descrito mayoritariamente asociada a la oclusión venosa, además de otras causas de isquemia retiniana. Presentamos un caso de PAMM en un paciente intervenido recientemente de una estenosis del tronco braquiocefálico mediante la colocación de un stent percutáneo.

Caso clínico:
Acude un paciente de 61 años a urgencias por escotoma paracentral en ojo derecho (OD) de 3 días de evolución. Como antecedentes destaca una intervención endovascular con colocación de stent en el tronco braquiocefálico 3 días antes. A la exploración, la agudeza visual con corrección es de 0.8 en el OD y de 0.7 en ojo izquierdo. En el fondo de ojo del OD se observa un exudado peripapilar inferior y un área de ligera palidez en la zona del haz papilo-macular. Ante estos hallazgos se decide realizar una OCT macular que muestra una hiperreflectividad de la capa nuclear interna sugestiva de PAMM.

Conclusión:
La PAMM es una complicación poco frecuente tras la colocación de stent carotídeo y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de pacientes con síntomas visuales posteriores a procedimientos endovasculares. La consideración de los antecedentes clínicos y el uso de la OCT como herramienta diagnóstica resultan fundamentales para su detección precoz y adecuado seguimiento evolutivo.