INFLAMACIÓ INTRAOCULAR DESPRÉS D'INJECCIONS INTRAVÍTRIES DE FARICIMAB

Olga Gil Bordas; Xavier Garrell Salat; Maria Xirgu Llach; Teresa Sánchez-Contador de Ros; Laura Sararols Ramsay

Hospital General de Granollers

El faricimab és un anticòs biespecífic aprovat per al tractament de la degeneració macular associada a l'edat neovascular (DMAEn), l'edema macular diabètic i l'edema macular secundari a oclusió venosa retiniana. Es va aprovar a Espanya al juliol de 2023 i durant la seva pràctica clínica s'han reportat casos d'inflamació intraocular (IIO). Presentem una sèrie de casos d'IIO després d'injeccions intravítries (IIV) de faricimab, diagnosticats i tractats entre abril de 2024 i juliol de 2025.

La incidència d'IIO en la nostra sèrie de casos va ser de 1,91% per pacient i d'0,36% per IIV de faricimab. Tots els casos que van patir IIO tenien DMAEn i la majoria havien estat pretractats amb altres anti-VEGF. Es va observar que la IIO apareixia en les primeres injeccions de faricimab (mitja de 3.4, rang 1-6).

La presentació clínica d'aquests pacients va ser en forma d'uveïtis anterior aguda, amb precipitats queràtics, hipertensió intraocular i vitritis. No es van detectar signes infecciosos ni vasculitis. La resposta al tractament amb corticoides i hipotensors va ser adequada. Tot i que la resolució va ser lenta, la major part van evolucionar favorablement i van recuperar l'agudesa visual prèvia a l'episodi d'inflamació intraocular.