20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

RESULTADOS PRELIMINARES DE AFLIBERCEPT 8 MG EN DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD: EVALUANDO LA PROMESA EN CONDICIONES DE VIDA REAL

José Guerra-Meniconi; Francesco Di Bin; Socorro Alforja; Ricardo Casaroli-Marano; Joan Giralt; Saray Catalan; Valentina Bilbao; Marc Figueras-Roca; Javier Zarranz-Ventura

Hospital Clinic de Barcelona

Introducción:
El ensayo PULSAR ha demostrado la capacidad de aflibercept 8 mg para mantener resultados visuales y anatómicos a 36 meses con reducción significativa del número de inyecciones y posibilidad de intervalos de hasta 24 semanas. Presentamos la experiencia preliminar con aflibercept 8 mg en pacientes con DMAE neovascular en nuestro centro.

Material y métodos:
Estudio prospectivo observacional con recogida de datos mediante la plataforma Fight Retinal Blindness. Se incluyeron características demográficas y oculares, AVMC (ETDRS), y análisis de OCT: cuantitativo (grosor central macular -CST-, volumen macular -VM-) y cualitativo (fluido intrarretiniano -IRF-, subretiniano -SRF-, y material hiperreflectivo subretiniano -SHRM-). También se registraron eventos adversos.

Resultados:
Se analizaron 234 ojos (204 switch [87,1%], 30 naïve [12,9%]). A los 3 meses, la AVMC mejoró en naïve (+2,3 letras; 59,7 a 62,0; p=0,003) y se mantuvo estable en switch (61,5 a 61,5; p=0,78). El CST se redujo de 288 a 254 µm. IRF (40,1% a 23,2%), SRF (63,2% a 35,3%) y SHRM (40,8% a 28,2%) disminuyeron significativamente (todas p<0,001). En naïve, también se redujo el VM (10,7 a 9,3 mm^3; p=0,01). No se reportaron efectos adversos.

Conclusiones:
Aflibercept 8 mg mostró seguridad y mejoras anatómicas en vida real, con ganancia funcional en naïve y estabilidad en switch. Estos resultados preliminares requieren seguimiento de 12-24 meses para confirmar su durabilidad y beneficio funcional a largo plazo.