20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

ADALIMUMAB PREVIENE MEJOR LAS RECAÍDAS CORIORRETINIANAS Y NEOVASCULARES QUE LOS INMUNOMODULADORES CLÁSICOS (CSIMT) EN EL COMPLEJO DE COROIDITIS MULTIFOCAL IDIOPÁTICA (IMFC)

Sol Burgos Herrera, Aina Moll Udina, Alfredo Adán Civera, Víctor Llorenç

Hospital Clínic

La PIC/iMFC representa el 7% de los casos de uveítis posteriores. Es bilateral en 50% de los casos, asincrónica, asimétrica y predomina en mujeres jóvenes con miopía. La neovascularización coroidea constituye su principal complicación.
Este estudio multicéntrico y retrospectivo comparó los periodos de tratamiento inmunomodulador sistémico con el manejo estándar. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de PIC o iMFC tratados con csIMT o adalimumab durante al menos 3 meses. Se analizó el número de recurrencias en tres regímenes: corticoides orales, csIMT y adalimumab. El resultado primario fue el número de recurrencias por paciente-año (PY) y los secundarios: el tipo de recurrencia (coriorretiniana o neovascular) y el número de intravítreas por PY.
Se analizaron 91 periodos de tratamiento de 52 pacientes con PIC/iMFC. El 88% de la cohorte eran mujeres. El análisis univariado mostró una reducción significativa del número de brotes durante los periodos de tratamiento con csIMT y adalimumab, en comparación con el tratamiento estándar ($p = 0,000$ y $p < 0,0001$). Se observó una diferencia significativa entre csIMT y adalimumab ($p = 0,024$). El análisis multivariado, solo adalimumab se asoció a una reducción significativa de los brotes coriorretinianos. Tanto csIMT como adalimumab redujeron las recidivas neovasculares y la necesidad de inyecciones intravítreas.
Adalimumab demostró una eficacia superior a csIMT en la reducción de los brotes coriorretinianos y neovasculares, lo que indica una mayor supresión de la inflamación coriorretiniana profunda. El estudio respalda el uso de adalimumab sobre los inmunomoduladores clásicos para prevenir las recurrencias en la PIC/iMFC.