20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

HEMORRÀGIA SUBRETINIANA MACULAR DESPRÉS D'UN BLOQUEIG SUBTENONIÀ DE CANT MEDIAL EN UNA CIRURGIA DE CATARACTA

Jaume F. Sánchez-Serra, Alejandro Verdu-Reyes, Marta Caminal-Caramés, José Ignacio Vela-Segarra

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

INTRODUCCIÓ

La cirurgia de cataracta disposa de diverses tècniques anestèsiques segons el perfil del pacient i les necessitats quirúrgiques. L'anestèsia tòpica és l'opció més utilitzada, seguida dels bloquejos retrobulbar, peribulbar i sub-Tenon, que impliquen injeccions amb un perfil de seguretat favorable. El bloqueig subtenonià de cant medial, amb accés a través de la carúncula, es considera una tècnica segura respecte a complicacions intraoculars greus.

CAS CLÍNIC

Es presenta el cas d'un home de 71 anys sense antecedents oftalmològics rellevants, sotmès a cirurgia de cataracta a l'ull dret amb bloqueig subtenonià de cant medial. Durant el procediment va desenvolupar una hemorràgia subconjuntival al lloc de la injecció, associada a dolor. Al postoperatori immediat va referir visió borrosa i persistència de l'hemorràgia subconjuntival. Les proves d'imatge multimodals van evidenciar una hemorràgia subretiniana a l'arcada temporal inferior, juntament amb una disrupció lineal de l'epiteli pigmentari de la retina, dues lesions maculars adjacents i una hemorràgia vítria lleu.

CONCLUSIÓ

El bloqueig subtenonià de cant medial és considerat una alternativa segura als bloquejos retrobulbar i peribulbar. No obstant això, en el cas present es va produir una hemorràgia subretiniana en el context d'una penetració ocular inadvertida, complicació no descrita prèviament a la literatura. Aquest cas permet discutir el mecanisme d'aquesta lesió i revisar el perfil de seguretat dels bloqueigs anestèsics en la cirurgia ocular.