QUERATITIS RECIDIVANTE EN PACIENTE JOVEN: DESAFÍO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

Juan Laraña; Josep Rosinés; Josep Torras

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción:
La infección por monkeypox virus (MPXV) es una zoonosis endémica de África central y occidental que desde 2022 se ha propagado globalmente, transmitiéndose principalmente vía sexual y afectando a hombres que tienen sexo con hombres. Suele caracterizarse por lesiones cutáneas, pero la afectación ocular, aunque infrecuente, puede ser grave.

Caso clínico:
Varón de 24 años, sin antecedentes médicos relevantes, consultó por dolor ocular, ojo rojo y visión borrosa en el ojo izquierdo. En la exploración presentaba una erosión corneal de 1,5×2 mm que progresó a úlcera de 4×5 mm con adelgazamiento, limbitis, precipitados queráticos y pérdida visual severa (0,05). Los estudios microbiológicos, serológicos y autoinmunes iniciales fueron negativos. Ante el empeoramiento, se realizó PCR de MPXV en superficie ocular, confirmando la infección, pese a la ausencia de lesiones cutáneas. Se instauró tratamiento con antivirales y corticoides tópicos y sistémicos en pauta descendente. En coordinación con Enfermedades Infecciosas, se administraron cinco ciclos de tecovirimat oral (600 mg/12 h, 2 semanas cada uno) con mejoría clínica transitoria y recidivas tras la suspensión. La persistencia de la positividad en PCR obligó a plantear alternativas no disponibles en España. Actualmente el paciente está estable sin evidencia de afectación ocular activa, aunque no se ha conseguido negativizar la PCR.

Conclusión:
La queratitis por MPXV es excepcional y plantea retos diagnósticos, pudiendo simular infecciones virales más frecuentes como el herpes simple. Este caso muestra un curso tórpido y recidivante, subrayando la importancia de la sospecha clínica, la confirmación microbiológica y el manejo multidisciplinar.