ENFERMEDAD INFLAMATORIA ORBITARIA IDIOPÁTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Potau, M.; Gallardo, E.; Santos, J.; Andorrà, C.; León, M.; Nash, J.

Hospital Parc Taulí

La enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática (EIOI) es la causa más frecuente de orbitopatía dolorosa en adultos. Puede involucrar cualquier estructura orbitaria, confundiéndose muchas veces con una conjuntivitis o celulitis orbitaria que no responde al tratamiento. Su diagnóstico es de exclusión tras haber descartado otras causas de inflamación y las opciones terapéuticas pueden ser varias.

Varón de 51 años que consulta por conjuntivitis derecha (OD) que no mejora a pesar de tratamiento. Explica otorragia y manipulación endonasal con bastoncillo días previos. Como antecedente oftalmológico presenta un defecto pupilar aferente relativo (DPAR) tras un traumatismo craneoencefálico años atrás.

En la exploración oftalmológica destaca una limitación a la supra, infra y abducción del OD, proptosis y quemosis.

En la tomografía computarizada orbitaria se observa un proceso inflamatorio / infeccioso orbitario derecho (con afectación intra y extraconal), imágenes sugestivas de discontinuidad ósea que afecta a la pared medial e inferior de la órbita derecha, así como proptosis y absceso inferior al músculo recto inferior derecho. Tras los hallazgos, se decide ingreso para tratamiento antibiótico y corticoterapia endovenosa, sin mejoría de la sintomatología a las 48h, por lo que se decide operar el absceso, mejorando la clínica 24h después.

De este modo, no siempre lo que en un principio parece ser una conjuntivitis o una celulitis orbitaria realmente lo es. Si el tratamiento inicial no da resultado, es necesario volver a evaluar al paciente y considerar otros diagnósticos, ya que algunos síntomas y signos de la EIOI pueden confundirse con los de otras enfermedades orbitarias.