20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

AKANTIOR 0,8 MG/ML COM A TERÀPIA DE LA QUERATITIS PER ACANTHAMOEBA EN CASOS REFRACTARIS AL TRACTAMENT CONVENCIONAL: A PROPÒSIT D'UN CAS

Erika Sanchez Vela; Miriam Ferran Fuertes; Magela Garat Chifflet; Monica Lecumberri Lopez; Carlos Luis Moser Wurth; Anna Soldevila Ribera

Consorci Sanitari Integral

Introducció:
La queratitis per Acanthamoeba en usuaris de lents de contacte pot ser un quadre de difícil diagnòstic precoç i amb resposta insuficient als esquemes terapèutics convencionals. Presentem un cas amb viratge clínic ràpid després d'introduir Akantior.

Cas clínic:
Home de 30 anys amb 48 hores de fotofòbia, dolor a l'ull dret i agudesa visual (AV) de 0,3. S'observa hiperèmia conjuntival, dos infiltrats temporals fluopositius i una pseudodendrita a l'hemicòrnia superior. Es prenen mostres per a cultiu i PCR. S'inicia tractament amb ceftazidima i tobramicina reforçades, voriconazol i clorhexidina al 0,02%. Als 4 dies, tot i la desaparició del dolor, persisteix la hiperèmia, apareix una segona pseudodendrita i fluonegativitzen els infiltrats, pel què s'intensifica la clorhexidina 0,02% cada hora i es redueix la resta de col·liris. A les 48 hores, apareix una tercera i es decideix desepitelitzar-les per afavorir la penetració intraestromal de la clorhexidina i reduir la càrrega amèbica. Amb l'aparició d'una nova pseudodendrita i PCR positiva per Acanthamoeba, s'augmenta la clorhexidina al 0,2% i s'hi associa posteriorment Brolene, a l'espera d'Akantior. Augmenta la pseudodendrita i apareix queratitis significativa per toxicitat del tractament. Finalment, s'inicia l'esquema terapèutic amb Akantior 0,8 mg/ml en monoteràpia.

Resultats:
Als 7 dies de l'inici d'Akantior s'objectiva la resolució de la hiperèmia, desaparició de pseudodendrites, infiltrats en fase leucomatosa i recuperació de l'AV fins a 1,0.

Conclusions:
En la queratitis per Acanthamoeba refractària, la introducció precoç d'Akantior quan l'evolució és tòrpida pot significar una millora ràpida de signes i de la funció visual.