REPTES DIAGNÒSTICS EN LA MALALTIA OCULAR RELACIONADA AMB LA IGG4: CORRELACIÓ CLÍNICO-PATOLÒGICA D'UN CAS

Bernat Nadal; Eugènia Moix; Maravillas Abia, Ferran Mascaró

Hospital Universitari de Bellvitge

La malaltia relacionada amb la IgG4 és un repte diagnòstic en Oftalmologia per la seva capacitat de simular processos malignes i la seva presentació amb troballes orbitàries inespecífiques. Presentem el cas d'un home de 64 anys amb antecedents de VIH en tractament, miopatia mitocondrial i carcinoma escamós d'esòfag, remès per a valoració de ptosi palpebral bilateral de dos anys d'evolució. El pacient referia dolor ocular crònic, diplopia i daltonisme des de l'adolescència.

L'exploració va mostrar alteració severa de la visió cromàtica (Ishihara 2/20), limitació global de la motilitat ocular, defecte pupil·lar aferent relatiu, proptosi i retropulsió augmentada a l'ull dret. Davant la sospita d'un procés infiltratiu es va sol·licitar una TC orbitària urgent, que va revelar una lesió de 25 mm al recte inferior dret, engruiximent del nervi infraorbitari i hipercaptació bilateral de les glàndules lacrimals.

El diagnòstic diferencial va incloure pseudotumor orbitari i infiltració limfoproliferativa, motiu pel qual es va realitzar biòpsia de la glàndula lacrimal dreta. L'estudi histopatològic va mostrar infiltrat limfoplasmocitari amb patró estoriforme i una relació IgG4+/IgG+ del 50%, juntament amb policlonalitat de cadenes kappa i lambda, troballes suggestives de malaltia relacionada amb IgG4 en aquest context clínic i radiològic.

Aquest cas subratlla la importància de considerar la IgG4 en masses orbitàries atípiques, ja que pot simular processos neoplàsics. La integració multidisciplinària i l'aplicació dels criteris diagnòstics revisats el 2023 per a la malaltia ocular relacionada amb IgG4 són essencials per assolir un diagnòstic correcte i orientar el maneig terapèutic.