HIPOTONIA POSTQUIRÚRGICA REFRACTÀRIA EN GLAUCOMA PSEUDOEXFOLIATIU: RESOLUCIÓ MITJANÇANT INJECCIÓ DE TISSEEL®

Tarrús Escalada, Francesc ; Muñiz Vidal, Romina ; Lynce Pavia Simoes Barreira, Leonor ; Mendieta Rasós, Núria; Blasco Suñé, Cristina ; Quiroz Quiroga, María Jesús

Hospital del Mar - Hospital Esperança

Cas clínic:
La hipotonia postoperatòria és una complicació relativament freqüent després de la cirurgia de glaucoma que, segons la seva severitat, pot requerir des de mesures conservadores fins a procediments més invasius. Es presenta el cas d'un home de noranta-un anys amb glaucoma pseudoexfoliatiu avançat a l'ull dret i agudesa visual (AV) 0.5. Malgrat el tractament farmacològic màxim i diverses intervencions quirúrgiques prèvies, no s'assolia un control adequat de la pressió intraocular (PIO), fet que condicionava la progressió de la malaltia. Es va optar per la revisió d'un dispositiu Preserflo®, associant Mitomicina C al 0,04% i la col·locació d'un implant de DuraGen® com a espaiador subconjuntival. En el postoperatori immediat, el pacient va desenvolupar una hipotonia ocular clínicament significativa (PIO 0 mmHg, AV PL) amb despreniments coroidals i maculopatia. La complicació es va abordar de manera seqüencial amb dues injeccions de sang autòloga i l'administració de viscoelàstic a la càmera anterior, sense aconseguir revertir la situació. Davant l'avançada edat i l'elevat nombre de reintervencions prèvies, es va decidir administrar Tisseel® a l'ampolla filtrant com a alternativa menys agressiva. Amb aquesta mesura es va obtenir una recuperació progressiva del to ocular, assolint una PIO de 8 mmHg i una AV de 0.2, amb estabilització clínica satisfactòria.

Conclusió:
En casos refractaris d'hipotonia postquirúrgica per ampolles hiperfiltrants, la injecció de Tisseel® pot contribuir a estabilitzar la PIO i preservar la funció visual, constituint una opció terapèutica menys invasiva respecte a noves cirurgies.