DEL QUIRÒFAN D'ORL A LA CONSULTA D'OFTALMOLOGIA: PRESENTACIÓ INUSUAL D'UNA FÍSTULA CARÓTIDO-CAVERNOSA

Mireia Miranda Piera; Maria Massaneda Tuneu; Yolanda Palomino Ortiz; Mouafk Asaad.

Consorci Sanitari de Terrassa

Introducció:
Una fístula carótido-cavernosa és una connexió anòmala entre l'artèria caròtida i el si cavernós que pot provocar complicacions oculars greus i, fins i tot, posar en risc la vida del pacient. Presenta signes i símptomes oftalmològics inespecífics que poden dificultar-ne el diagnòstic inicial, ja que es poden confondre amb una patologia orbitaria primària. Es tracta d'una entitat poc freqüent, i encara més excepcional com a complicació de la cirurgia endonasal, la qual cosa pot endarrerir el diagnòstic.

Cas clínic:
Home de 62 anys que debuta amb episodis d'hiperèmia i dolor a l'ull esquerre. A l'exploració oftalmològica es va evidenciar hiperèmia conjuntival i quemosi, així com edema de papil·la. Inicialment, el cas es va orientar com a glaucoma d'angle tancat atesa la presència d'una càmera estreta i una pressió intraocular elevada. Davant la manca de millora malgrat el tractament, es van revisar els antecedents, entre els quals destacava una intervenció de septoplàstia amb reducció de cornets nasals un mes abans, fet que va fer sospitar una possible fístula carótido-cavernosa. En realitzar una angioRMN, es va observar una opacificació precoç del si cavernós esquerre amb dilatació de la vena oftàlmica superior ipsilateral, fet que va ser decisiu per sospitar el diagnòstic i guiar els següents passos.

Conclusions:
La fístula caròtido-cavernosa és una complicació greu i poc freqüent de la cirurgia endonasal, que s'ha de sospitar davant la presència de signes oculars en el postoperatori. El diagnòstic i el tractament precoç són essencials per preservar la visió i reduir la morbimortalitat.