20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

RECIDIVA CONTRALATERAL DE LINFOMA ORBITARIO DE GLÁNDULA LAGRIMAL

Aina Bals Genestar; Maria Massaneda Tuneu; Yolanda Palomino Ortiz; Mouafk Asaad

Consorci Sanitari de Terrassa

Introducción:
El linfoma ocular es una neoplasia maligna que representa el 5-10% de los linfomas extranodales, siendo el linfoma de la zona marginal del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) el más frecuente. Su presentación es variada y puede ser inespecífica, siendo fundamental realizar una buena anamnesis y exploración para un reconocimiento temprano. Resultará imprescindible hacer pruebas de imagen y una biopsia con estudio histopatológico para el diagnóstico definitivo.

Caso clínico:
Paciente mujer de 75 años con antecedente de linfoma orbitario de glándula lagrimal izquierda en 2015 que acude a la consulta oftalmológica por tumoración orbitaria derecha de 2 meses de evolución. Presenta una masa indurada y móvil en canto superoexterno, dolorosa a la palpación sin otras afectaciones. Para su estudio se solicita analítica sanguínea, RM orbitaria y biopsia con inmunohistoquímica de la glándula lagrimal en la que se confirma el diagnóstico de linfoma marginal tipo MALT. Se realiza manejo conjunto con Hematología, quien solicita estudio de extensión que demuestra afectación renal, por lo que se decide tratamiento con radioterapia y quimioterapia con ciclofosfamida.

Conclusión:
El linfoma de la glándula lagrimal se manifiesta como una tumoración en la región superoexterna de la órbita unilateral y clínicamente puede simular procesos inflamatorios o infecciosos. Aunque la recidiva es poco frecuente, puede presentarse en la misma localización, de forma contralateral o en otra localización extranodal. Por ello, es esencial mantener un alto índice de sospecha clínica, complementado con estudios de imagen y confirmación histopatológica, para un diagnóstico precoz y manejo oportuno.