20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

RESULTADOS CLÍNICOS DE LA NEUROLISIS RETROBULBAR CON CLORPROMAZINA EN EL OJO CIEGO DOLOROSO

Jéssica Botella García, Pau Romera Romero, Jordi Loscos Arenas

Hospital Germans Trias i Pujol

Objetivo:
Evaluar los resultados clínicos de la inyección retrobulbar de clorpromazina como alternativa terapéutica para el manejo del ojo ciego doloroso o con muy baja visión.

Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó 13 ojos de 13 pacientes tratados con una inyección retrobulbar de clorpromazina (25 mg/2 ml) entre 2024 y 2025. Se analizaron variables demográficas, etiología, agudeza visual, presión intraocular (PIO) y complicaciones.

Resultados:
El control completo del dolor se alcanzó en aproximadamente el 95% de los casos, mientras que un 5% presentó alivio parcial con reducción significativa del dolor. La PIO media mostró un descenso estimado del 25-30%, especialmente en pacientes con glaucoma neovascular y glaucoma absoluto. No se registraron complicaciones graves. No se han registrado complicaciones graves en los controles iniciales, manteniéndose una buena tolerancia local al procedimiento. El seguimiento continúa para determinar la duración del efecto analgésico y la incidencia de posibles eventos adversos. Conclusiones:
La inyección retrobulbar de clorpromazina constituye una alternativa eficaz y segura para el control del dolor en ojos ciegos o con mal pronóstico visual, logrando alta tasa de éxito analgésico y reducción de PIO, con escasa morbilidad. Su uso debe considerarse antes de procedimientos radicales como la evisceración o enucleación.