20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

INDUCCIÓN DE ASTIGMATISMO SEVERO POR LESIONES CORNEALES ASOCIADAS A ROSÁCEA OCULAR

Graff Hector Mauricio, O'Farrell Mercedes, Navas Maria Alejandra, Sorrentino Araceli

Instituto Catalán de Retina

Presentar caso de paciente pediátrica con rosácea ocular, su presentación clínica, complicaciones y tratamiento. También se discutirán diagnósticos diferenciales. Caso clínico: Paciente de 14 años consulta por ojos rojos y fotofobia de 5 meses de evolución. AV inicial OD 1; OI 0,4. BMC AO Leucomas corneales con neovasos y pannus. Recibió tratamiento con tacrolimus 0.03%, losartán colirio y doxiciclina vía oral. Durante seguimiento, se detecta astigmatismo elevado en AO secundario a lesiones corneales, y signos cutáneos. Discusión: La rosácea ocular forma parte de las blefaroqueratoconjuntivitis crónicas y su diagnóstico es un reto, sobre todo en población pediátrica. Esto deriva en tratamiento tardío y más complicaciones. Conclusión: Ante toda blefaroconjuntivitis crónica y lesiones cutáneas, considerar rosácea ocular. El diagnóstico y tratamiento oportuno, previene lesiones crónicas y mejora el pronóstico visual.