20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

MANEJO OFTALMOLÓGICO DEL RECIÉN NACIDO CON ICTIOSIS CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Alba Jordan; Karam Yousef; Judith Ramirez; Marta Babinska; Silvia Alarcón

Hospital Vall d'Hebron

Las ictiosis congénitas hereditarias constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades cutáneas raras, caracterizadas por una alteración en la cornificación epidérmica que condiciona descamación generalizada y engrosamiento cutáneo. Entre sus formas más severas se encuentra la presentación neonatal como ?bebé colodión?, cuadro clínico en el que el recién nacido se encuentra recubierto por una membrana brillante, tensa y amarillenta que puede ocasionar complicaciones multisistémicas. La afectación oftalmológica en estos pacientes es relevante, pues la retracción de los párpados secundaria a la rigidez cutánea puede originar ectropión, exposición conjuntival y corneal, sequedad ocular y riesgo de queratitis infecciosa, comprometiendo seriamente la visión a largo plazo.
Se presenta el caso de un recién nacido prematuro con fenotipo de bebé colodión, quien mostró desde las primeras horas de vida eversión palpebral bilateral e imposibilidad de cierre ocular completo. El manejo inicial se enfocó en la protección de la superficie ocular mediante lubricación intensiva con lágrimas artificiales sin conservadores y pomadas lubricantes, junto con medidas generales de control ambiental. Se instauró vigilancia estrecha para la detección temprana de lesiones corneales y se coordinó el abordaje multidisciplinario con dermatología y neonatología.
El caso resalta la importancia de la intervención precoz del oftalmólogo en el contexto de ictiosis congénitas. La identificación temprana de complicaciones oculares y la aplicación de medidas de soporte permiten prevenir secuelas visuales irreversibles. Asimismo, se enfatiza la necesidad de un seguimiento continuo y de protocolos de manejo consensuados que optimicen la calidad de vida y el pronóstico funcional visual de estos pacientes.