20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

MACULOPATÍA EN OJO DE BUEY POR ANTIPALÚDICOS EN PACIENTE CON LES: SEGUIMIENTO DE 8 AÑOS

Clara Martí, Alicia Esmeralda Traveset, Paula Betancort

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

INTRODUCCIÓN

El uso de antipalúdicos es habitual en el manejo de patologías reumatológicas. Dentro de sus efectos adversos destaca la toxicidad a nivel macular que debe ser detectada precozmente ya que esta suele ser irreversible.

CASO CLÍNICO

Mujer de 48 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES), en tratamiento con hidroxicloroquina 400 mg/día durante 3 meses. Acude para valoración oftalmológica sin hallazgos patológicos iniciales. La paciente mantuvo el tratamiento un período de 2 años que después viró a cloroquina (155 mg/día). Posteriormente se aumentó la dosis a 310 mg/día para control de un brote de LES hasta el 2022, momento en el que se volvió a la pauta anterior de cloroquina.

Se solicitaron campimetría 10-2 y OCT macular, con controles anuales sin alteraciones destacables hasta 2023. En ese momento, y ante los siguientes hallazgos: escotomas superiores en campimetría, engrosamiento macular inferior en OCT y alteraciones de fotorreceptores en ERG flash en OD, se decidió suspender el antipalúdico.

Ulteriormente, persistieron los hallazgos funcionales y en OCT macular se objetivaba rectificación del perfil foveal con pérdida de la banda del elipsoide, además del signo del platillo volante, por lo que se estableció el diagnóstico de maculopatía en ?ojo de buey? secundaria a antipalúdicos.

CONCLUSIÓN

Este caso pone en evidencia la importancia del control periódico en pacientes bajo tratamiento antipalúdico, dado el riesgo de toxicidad retiniana incluso tras suspender el fármaco, y resalta el valor del OCT macular y CV 10-2 como herramientas clave en la detección precoz.