20-22 DE NOVEMBRE DE 2025
AUDITORI L'ILLA/BARCELONA
Societat Catalana d'Oftalmologia
56è CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA
OFTALMOLOGIA 360º

ESPECTRO CLÍNICO Y MANEJO DEL ANEURISMA MILIAR DE LEBER: SERIE DE DOS CASOS.

Ivana Murray; Alexandra E. Istrate; Mouafk Asaad; Laura Gutiérrez Benítez

Hospital Universitario de Terrassa (Consorci Sanitari Terrassa)

Objetivo: Describir el espectro clínico, las estrategias de manejo y los resultados visuales de dos casos de aneurismas miliares de Leber (AML), destacando la variabilidad de su presentación y evolución.

Material y métodos: Se presenta una serie de casos retrospectiva de dos pacientes adultos diagnosticados de AML. Se analizaron las características demográficas, la agudeza visual (AV) inicial, los hallazgos en la exploración oftalmológica, la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la angiografía fluoresceínica (AGF). Se documentaron las diferentes estrategias terapéuticas empleadas y los resultados anatómicos y funcionales finales.

Resultados:
- Caso 1: Varón con AV previa de 0.8 y presencia de fluido intrarretiniano y subretiniano (FIR/FSR). Fue tratado mediante inyecciones de aflibercept y un implante de dexametasona, logrando la resolución completa del fluido y una AV final de 0.95.
- Caso 2: Mujer con AV previa de 0.6 y presencia de FIR/FSR. Recibió tratamiento con un implante de dexametasona y fotocoagulación láser focal. Se consiguió la resolución del fluido con persistencia de exudados duros, alcanzando una AV final de 0.4.

Conclusiones: El AML presenta una notable heterogeneidad clínica. El diagnóstico tardío o la afectación macular pueden provocar pérdida visual irreversible, por lo que el reconocimiento precoz, la imagen multimodal y la intervención oportuna con láser e inyecciones con agentes anti-VEGF o corticosteroides, según sea necesario, son esenciales para preservar la visión, mediante un manejo que debe ser individualizado y escalonado.